



4. GELAKO PRAKTIKA. ABDOMEN AKUTUA. HESTE BUTXADURAK. HIRSCHSPRUNG GAIXOTASUNA.

1. ABDOMEN AKUTUA: sabeleko mina sintoma ohikoa da haur eta nerabeengan.
Larrialdietako kontsulten % 5-10 suposatzen du.

Helburuak:

- a. Abdomen akutuaren egoera identifikatzea
- b. Jatorri ohikoenak adinaren arabera (bularreko haurrak, eskola-umeak...).
- c. Diagnostikorako anamnesian jaso beharreko datu garrantzitsuak.
- d. Jarraitu beharreko jokabidea.

2. HESTE-BUXADURAK:

- a. Esofagikoak (motak, klinika, diagnostikoa eta tratamendua)
- b. Heste butxadura altuak (PEH, atresia duodenala, eraztun formako pankrea, goiko arteria mesenterikoaren sindromea)
- c. Heste butxadura baxuak (inbaginazio intestinala, Meckelen dibertikulua, Hirschsprung gaixotasuna)

3. KASU KLINIKOAK:

- a. Hestegorriko atresia
- b. Píloro-estenosi hipertrofikoa
- c. Inbaginazio intestinala.
- d. Apendizitis akutua.
- e. Hirschsprung gaixotasuna.

Referencia: Manual Cruz. 4ª edición. J.J.García, O.Cruz, S.Mintegi, J.M.Moreno (Sección 10) (caps.10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36) Coordinador: Victor Navas. Autores: R. Torres Peral, E. Balmaseda Serrano, A. Recober Montilla, S. Hernández del Arco, C. Ochoa Sangrador, C. Trillo Belizón, A. Bautista Casanovas; M.J. Moya Jiménez, R. Granero Cendón