



12. KLASE MAGISTRALA. BRONKIOLITIS. ASMA

Klasea 3 ataletan banatzen da:

Bronkiolitisa: Bronkiolitis akutua (BA) bronkioetako arnasketa-zailtasun distalaren lehen gertakaria da 2 urtetik beherako haur baten kasuan, arnas birus sinzitialak (VRS) eragiten du nagusiki, eta pediatriako ospitaleratzearen arrazoi nagusia da.

Definizioa, epidemiologia eta arrisku faktoreak, etiologia, fisiopatogenia klinikoa, diagnostikoa eta tratamendua

Sibilantzia errepikariak: Eskolaurreko umearen sibilantzia errepikariak honela definitzen dira: 3 sintoma edo gehiago izatea, arnasbideetan aireko fluxua mugatuz bizitzako lehen hilabeteetan edo urteetan. Hiru haurretatik batek gutxienez sibilantzia-gertakari bat du bizitzako hirugarren urtea baino lehen. Gehienetan, faktore abiarazlea birusak eragindako arnas infekzioa izaten da, eta hainbat faktorek bultzatzen dute birusak errepikatzea.

Definizioa, epidemiologia, aldi-bateko sibilantziak, atopikoak eta behin-betiko ez atopikoak.

Asma: Asma haurtzaroko gaixotasun kroniko ohikoena da. Hainbat intentsitate-mailatako ezul, sibilantzia, disnea eta zapalkuntza torazikoaren gertakarien presentziak definitzen du. Agerraldiak izaten ditu, eta pazienteak sintomarik gabekoak izan daitezke, bai gaixotasunaren kontrolagatik, bai gaixotasunaren historia naturalagatik.

Definizioa, epidemiologia, fisiopatologia, Klinika, sailkapena, abiarazleak.

Diagnostikoa, diagnostiko diferentziala eta tratamendua